



Progetto: Le nostre Mosche

Bollettino informativo

N 5

del 18 agosto 2016

Andamento infestazione della mosca delle olive

		Punto di monitoraggio (località)	Tipologia oliveto	Infestazione				Ultimo trattamento	
				ATTIVA (%)	Mortalità (%)	DANNOSA (%)	TOT (%)	Data	Prodotto utilizzato
al piano	1	Via Gragnola	P.integrata	2,0	7,0	1,0	10,0	26/7	Dimetoato
	2	Via Alta	P.integrata	0,0	0,0	1,0	1,0	12/8	Caolino
	3	Az.Monteverde	P.integrata	Trattato				26/7	Dimetoato
100 - 200m	4	Loc. Caprognano	P.integrata	4,0	15,0	1,0	20,0		
sopra 200 metri slm	5	Vallecchia - Colletto	P.integrata	7,0	39,0	1,0	47,0	26/7	Dimetoato
	6	Fosdinovo-Via Celso	P.integrata	16,0	57,0	0,0	73,0	23/7	Dimetoato

Rete di monitoraggio completa

Infestazione ATTIVA: uova e larve giovani vive della mosca

Infestazione DANNOSA: larve mature (di terza età) vive e morte, pupe e fori d'uscita della mosca

Infestazione TOTALE: comprende tutte le olive infestate, anche le forme morte.

Commenti:

Descrizione situazione:

al piano	È iniziata la seconda generazione estiva di mosca delle olive , infatti in alcuni punti sono presenti pupe, fori d'uscita e uova . La mortalità rinvenuta negli oliveti trattati, dimostra l'efficacia degli interventi quando effettuati nei tempi giusti. L'unico punto che si mantiene con bassa infestazione (Via Alta), lo deve, oltre che ad interventi mirati con colino, molto probabilmente, a condizioni microclimatiche e di coltivazione dell'olivo particolari
100-200 m slm	
sopra 200 m slm	

Consigli per gli olivicoltori:

al piano	Chi esegue il trattamento larvicida (p.es. con Dimetoato o Imidacloprid) e ha superato la soglia del 10% di Infestazione Attiva deve eseguire il trattamento entro una settimana. Chi non ha superato la soglia attendere il prossimo bollettino
100-200 m slm	
sopra 200 m slm	Chi esegue trattamenti adulticida - preventivo (come in olivicoltura biologica) deve eseguire il trattamento contro gli adulti della seconda generazione della mosca il prima possibile

Si raccomanda di tener conto delle norme in vigore in Liguria e Toscana che prevedono limitazioni d'uso dei diversi prodotti utilizzati per il trattamento larvicida (p.es. Dimetoato max 2 trattamenti/anno)

Terminologia

Strategia adulticida: mira ad uccidere (o allontanare) gli adulti di mosca prima che le femmine ovidepongano nelle olive

Strategia larvicida: mira ad uccidere le larve (giovani, di circa 1-7 giorni) dentro le olive